



花卉篇： 繁星花

• 陳信安 •

繁星花為多年生草本植物，茜草科繁星花屬，其耐熱、耐旱的特性，極適合在春、夏二季種植。株高約25~80公分，葉片長披針形、對生。繖形花序著生於莖頂，每一分枝皆可著生，常見數十朵的星狀小花齊聚綻放於莖頂，真是熱鬧非凡，十分有趣。另外值得一提的是，繁星花“招蜂引蝶、四下放電”的本事也是草花中難得一見的。

繁星花以播種或扦插皆可，但扦插存活率差強人意；如要大規模繁殖，仍以播種較為省工。一般市售繁星花種籽只有粉衣種籽(種子外層裹覆一層藥粉)，以便利機械播種。播種後不用覆土，但最好定時噴霧給水，使育苗介質充份保持濕潤，以利種子外層粉衣迅速溶解。

發芽適溫為22~26°C，發芽天數約8~12天，育苗期約60~75天(288格穴盤)；定植後約45~55天開花。基本上繁星花以溫暖季節繁殖效果較佳，冬季寒流來襲時可能種子不發芽、延遲發芽或凍傷。

苗期頗長，於苗期施用葉綠精2000~1500倍、甜果精2000~1500倍輪流施用，約7天一次。施肥後再短暫噴水，以防肥害。施肥後的1~3天內也不宜缺水，以防止鹽害。播種介質pH值6.5~6.8、EC值0.75左右(不可覆蓋種子

)。

繁星花可適應全日照至半日照的環境，不喜歡積水、潮濕的環境，以排水性良好之砂質壤土或滿地王盆栽土，再酌加珍珠石加強排水是不錯的選擇。肥料可選用花彩多的緩效肥每株約2~3g，成株追肥可施用甜果精或開花精1000倍，花彩多則約3個月追肥一次。

繁星花喜歡土壤略中性的栽培環境，pH值要維持6.6~7.0，若pH值低於6.5，則有可能發生葉燒、葉脈黃化、葉片反離、扭曲等鐵中毒現象。若發生pH值過低的情形，可酌加苦土石灰提高介質pH值。低溫時有開花數減少甚至凍傷、寒害的情形。

病蟲害有刺吸式害蟲(如蚜蟲、介殼蟲)，以清香苦棟油100~200倍防治，雨季前後可施用億力1000倍做一般性防護藥劑。

繁星花的花色以紅、紫紅、桃、粉、白色為主。市面上暢銷品種以「蝴蝶夫人」、「新象」二個品種為主。「蝴蝶夫人」株高約40~55公分，耐病力佳、花色多，為主要暢銷品種。「新象」為極矮性品種，株高約20~30公分，小巧可愛，但不耐病害，雨季後易罹病。