

安徽甜瓜翠甜栽培技术

一. 品种介绍:

- 1、雌花发生稳定，座果率高。播种至始收 85 天左右，适于温暖期栽培，低温期瓜较小。
- 2、瓜高球形，单瓜重 1.5kg 左右，瓜皮灰绿色，粗密网纹布满全瓜。
- 3、果肉绿白色，中心可溶性固形物含量 17%左右，肉质细腻。金顶 黄皮橙肉品种，单果重 1.5KG 左右，果面光滑亮丽，肉质脆爽，口感极佳，平均糖度 16-18 度，植株长势中等，可适当密植。

二. 栽培技术:

1. 播种育苗:

- (1) 播种季节：主要以大棚栽培为主，春季播种季节为 12 月份到翌年 3 月份，秋季播种季节为 6 月底到 7 月底。
- (2) 以甲基托布津 500 倍液消毒 30 分钟，用清水冲洗干净，然后用水浸种 3.5 小时，装入网袋，裹上温度适宜的毛巾，套上薄膜袋后，人体催芽 24 小时。或用恒温箱催芽，28 度左右催芽 20 个小时左右，芽尖露白即可。多采用 50 孔的穴盘，或 9*9 的营养钵，抢早栽培的用营养钵育苗更利于培育壮苗。

2. 整地作畦，施基肥:

- (1) 基肥以农家肥为主，用充分腐熟的有机肥为基础，基肥每亩地可增施 5kg 的碳酸钙及 1KG 的硼砂，用以平衡土壤酸碱度及补充微量元素。

(2) 畦宽 2m，畦面平整，畦面适当做高，利于水分的控制。

畦面盖银黑双面地膜，不仅有黑色地膜的全部功能外，还可以驱赶蚜虫，减少病毒病的发生。

3. 定植：

苗 3-4 片真叶时定植，定植于大棚内，再加 2 层小拱棚，该品种株型不旺，可以适当密植栽培，以提高产量。

伏地栽培：株距为 45-50cm，亩栽 650 株。（不推荐伏地栽培，果面有阴阳面）

立式栽培：株距为 40-45cm。亩栽 1600-1800 株。定植后，每穴浇一勺定根水（加杀菌剂）。晴天时，上午 10 点后逐渐掀开小拱棚膜见光，下午 2 点钟后又盖上薄膜。

4. 田间管理：

(1) 灌水追肥：

① 定植 5-7 天后，选晴天的上午 10 点左右，浇 800 倍叶绿精提苗。

② 又一周后，再选晴天的上午 10 点左右浇 600 倍液叶绿精。

③ 授粉前 3 天，一般再追 1 次钙液，或提前 7-15 天喷洒开花精。

④ 授粉后 7 天左右，在根端处浇复合肥和叶绿精 1000 倍喷施。

⑤ 采收前两周严格控制水分，观察天气变化提前做好预防

措施，大棚外做好排水措施，以滴管为宜，避免成熟后期水分大造成品质下降及裂果。

（2）植株调整：

双蔓整枝，一般在 3-4 片真叶时摘心，让子蔓生长出来，然后选留 2 条生长良好的子蔓，将另外子蔓打去，以后进行引蔓，并及时抹去侧芽。

网纹甜瓜不建议爬地栽培，容易产生阴阳面，但可以采用该方法栽培，通常是双蔓双果栽培。

一般在 12-14 节位进行授粉，授粉时间在每天的 8-10 点，在低湿或阴天时，以座果灵或毛笔蘸花，雄蜂或人工授粉建议留 2-3 果后期疏果，坐果灵处理一般留一个果就可以。

三. 采收：

1. 熟期判断：

（1）熟期天数：以点花后天数计算，春季一般在 42 天左右，秋季在 39 天左右。

（2）瓜前叶开始发焦。

2. “T”型留瓜蔓采收，既更美观，又更耐贮存。依大小分级包装。

3. 产量：

伏地栽培一般在 1500-2000KG，立式栽培一般在 2500KG 左右。

*注意事项：

1. 该品种前中期长势偏弱，注意肥水管理，及病虫害防止。

2. 上市前半个月左右开始控制水分，防止裂果，或直接提早上市。
3. 开沟起垄，避免雨水进棚，造成早衰及影响商品性。



[培育壮苗，3-4 叶可以定植]



[定植后需要整枝打岔，覆盖地膜]



[坐果后，再留一叶摘心]



[网纹形成初期，控制水分，避免裂口]



[坐果约 40 天开始上市]



[分级包装上市]