

# 广西薄皮甜瓜美浓品种特性及栽培技术



## 品种特性

**美浓：**生育强健，抗病性好，适应性强，易栽培，果实梨型，大小整齐，成熟时果皮呈淡黄白色，果重约 450 克，肉色淡白绿，糖度约 16%，肉质细腻，风味佳，持续风靡华南市场，丰产。

## 栽培技术要点

1. **种子处理：**晒种 1-2 小时，清水浸种 3-5 小时，甲基托布津 1000 倍液浸泡 15 分钟消毒，清水冲净至无甲基托布津的味道，30℃催芽至露白，播种。

### 2. 播种育苗：

采用穴盘或营养杯育苗，种子平放，胚根朝下，再盖上 0.5-1 厘米厚的细土。

## 苗期管理

(1)、光照：苗床选在通风良好，光照充足的地方，早春育苗白天打开拱棚让幼苗见光以免徒长。

(2)、水分：要求见干见湿、早浇晚不浇为原则。

(3)、温度：苗床要求温度有 25℃左右，故早春加盖小拱棚，夏秋采用遮阳网降温。

(4)、肥料：一般不必另外追肥，但依长势可用叶绿精 800-1500 倍淋于苗床。

(5)、病害：苗期常见的病害有猝倒病、立枯病、及早春低温的沤根现象。具体的防治措施有尽量控制好苗床的温度与湿度，加强见光通风并用强力死苗一号或恶霉灵、宝力克等农药混合叶绿精淋于苗床。

### 3. 整地作畦：

将地翻晒后打碎起畦，一般起 2.5-3 米宽的畦面（连沟），中间施入基肥，以农家肥为主，亩施 1500-2000 斤+复合肥 100 斤，并盖上地膜。

4. 定植管理：当幼苗长至二叶一心时可定植。株距 55-60 厘米，并以对爬的方式种植，定植后马上淋足定根水，亩栽 650-800 株。

### 5. 栽培管理：

#### (1) 水分

夏秋雨季注意做好排水工作，避免出现积水，保持田间“宁干勿湿”的原则，以免疫病，霜霉病，白粉病等暴发，并以花期、成熟期控水，定果后大水为原则。

#### (2) 肥料

一般施足底肥后可少追肥，但定植后可用叶绿精 800-1500 倍液

灌根 1-2 次以促进伸蔓，膨果期可追一次复合肥。

### （3）整枝留果

定植后幼苗长至 5-6 片真叶时打顶摘心，让其侧枝生长，并选留 3-5 条侧蔓，其余侧蔓打掉，并在侧蔓 8-12 节留瓜，其余孙蔓打掉，苗长至 1.5 米左右进行打顶，一般 5-6 瓜/株。

### （4）病虫害防治

（病虫害防治病害防治，苗期注意猝倒病；定植后早期注意立枯病；整体生育期注意、疫病、蔓枯病、白粉病，霜霉病、病毒病等；虫害主要有蚜虫、蓟马、潜叶蝇、瓜实蝇等，相关病害、虫害防治用药可参考瓜菜用药指南。

### 各地区适合播种期建议

| 播期   | 秋作    | 春作   | 备注 |
|------|-------|------|----|
| 广西地区 | 9 月上旬 | 1 月份 |    |

### 品种注意事项

- 1、种植薄皮甜瓜要注意及时整枝打顶，尽量减少养分消耗。
- 2、氮肥不要过量使用，以免徒长座瓜难。。
- 3、多雨或水分过多注意防治白粉病及霜霉病。

